

CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

PREPARO PARA ENDOSCOPIA A TARDE

Data: ____/____/____ Horário: ____:____

- No dia do exame é permitido fazer um lanche leve até as 06hs da manhã (sugestão: chá e suco de cor clara, água de coco, bolacha “água e sal”. Torradas sem manteiga ou requeijão e que não seja integral). Não tomar leite e nem consumir derivados de leite no dia do exame.
- É necessário fazer jejum de alimentos de no mínimo, 08 horas antes do exame.
- Água e água de coco poderão ser ingeridas até 2 horas antes do exame, desde que em pequenas quantidades.
- 20 minutos antes do procedimento tomar 50 gotas de Dimeticona (Luftal, Mylicon, simeticona...)
- É obrigatório o paciente estar acompanhado e levar o pedido médico, carteirinha e o documento de identificação (não pode dirigir após o procedimento)

Em caso de desistência favor ligar 27 30243925/ 999537105

ENDEREÇO

☐

SKOPIA – MATERNIDADE SANTA PAULA

Rua HerwanModenesi Wanderley, 100, Sala 309, Jardim Camburi – Vitória – ES

☐

SKOPIA – CENTRO MÉDICO SHOPPING VITÓRIA

Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá – Vitória - ES

OBSERVAÇÕES:

- Vir acompanhado.
- Se diabético não tomar insulina ou anti-diabético oral no dia do exame.
- Se tomar AAS, aspirina ou similar (doril, melhoral) e anti-inflamatórios (diclofenaco, cataflam, voltaren, nimesulida, meloxicam suspender 7 dias antes do exame.
- Paciente em uso de Saxenda suspender por 07 dias antes do exame. Paciente em uso de Ozempic suspender por 14 dias.
- Se tomar ticlopidina (Ticlid) ou clopidogrel (Plavix), suspender 7 dias antes.
- Suspender também sulfato ferroso.
- Tomar todos os remédios de uso diário no dia do exame, exceto os descritos acima.
- Se estiver usando anti-coagulantes (marevan, warfarin), avisar previamente.
- Não dirigir durante todo o dia, ficar em casa.
- Trazer o pedido do exame do médico, a carteira do convênio e demais exames recentes.
- Não fazer uso de salto alto.

COMPARECER AO LOCAL DO EXAME COM 30 MIN DE ANTECEDÊNCIA