

## CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO PREPARO PARA ENDOSCOPIA

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_:\_\_\_\_

- Jejum de no mínimo 10 horas antes do exame. Para exames no período da manhã, o paciente não deve comer nada a partir das 20:30hs do dia anterior (até água).
- É liberado meio copo de água de coco até duas horas antes do exame.
- Exames a tarde é liberado água e água de coco até duas horas antes do exame.
- 20 minutos antes do procedimento tomar 50 gotas de Dimeticona (Luftal, Mylicon, simeticona...)
- É obrigatório o paciente estar acompanhado e levar o pedido médico, carteirinha e o documento de identificação (não pode dirigir após o procedimento)

Em caso de desistência favor ligar 27 30243925/ 99953-7105



### ENDEREÇO

☐

SKOPIA – MATERNIDADE SANTA PAULA  
Rua HerwanModenese Wanderley, 100, Sala 309, Jardim Camburi – Vitória – ES

☐

SKOPIA – CENTRO MÉDICO SHOPPING VITÓRIA  
Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá – Vitória - ES

### OBSERVAÇÕES:

- Vir acompanhado.
- Se diabético não tomar insulina ou anti-diabético oral no dia do exame.
- Se tomar AAS, aspirina ou similar (doril, melhoral) e anti-inflamatórios (diclofenaco, cataflam, voltaren, nimesulida, meloxicam suspender 7 dias antes do exame.
- Paciente em uso de Saxenda suspender por 07 dias antes do exame. Paciente em uso de Ozempic suspender por 14 dias.
- Se tomar ticlopidina (Ticlid) ou clopidogrel (Plavix), suspender 7 dias antes.
- Suspender também sulfato ferroso.
- Tomar todos os remédios de uso diário no dia do exame, exceto os descritos acima.
- Se estiver usando anti-coagulantes (marevan, warfarin), avisar previamente.
- Não dirigir durante todo o dia, ficar em casa.
- Trazer o pedido do exame do médico, a carteira do convênio e demais exames recentes.
- Não fazer uso de salto alto.

COMPARECER AO LOCAL DO EXAME COM 30 MIN DE ANTECEDÊNCIA